



NOTA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DA REQUISIÇÃO

SOLICITANTE: MM. Juiz de Direito Dr. Paulo José Rezende Borges

PROCESSO Nº.: 0143190027993

SECRETARIA: Vara cível, infância e juventude e juizado especial

COMARCA: Carmo do Paranaíba

I – DADOS COMPLEMENTARES À REQUISIÇÃO:

REQUERENTE: GHC

IDADE: 09

PEDIDO DA AÇÃO: MEDICAMENTO

DOENÇA(S) INFORMADA(S) – (CIDs): L23 , H02

FINALIDADE / INDICAÇÃO: Tratamento de dermatite atópica

NÚMERO DO CONSELHO: ilegível

II – PERGUNTAS DO JUÍZO:

Os medicamentos TRACOLIMUS POMADA 0,03%; NEOMICINA POMADA; PATANOL COLÍRIO; ECOFILM COLÍRIO; NASONEX SPRAY e MOMETASONA POMADA são indicados e apresentam comprovada eficácia no tratamento de criança (09 anos) diagnosticada com DERMATITE ATÓPICA e CONJUNTIVITE ALÉRGICA? Existe alternativa terapêutica disponibilizada pelo SUS que seja eficaz ao caso, substituindo os medicamentos receitados?

III - CONSIDERAÇÕES SOBRE O CASO:

Conjuntivite alérgica / outras conjuntivites, Conjuntivite alérgica é definida como uma resposta inflamatória iniciada por reações de hipersensibilidade do tipo I e/ou tipo IV após exposição a um alérgeno.



A gravidade da reação alérgica se relaciona à intensidade da resposta inflamatória, à idade do paciente e aos fatores genéticos e geográficos. O diagnóstico diferencial pode ser feito de acordo com os achados clínicos, embora alguns pacientes, eventualmente, apresentem achados de mais de um tipo de conjuntivite alérgica, resultando em dúvidas diagnósticas.

Seis tipos de alergia ocular estão descritos na literatura: conjuntivite alérgica sazonal (febre do feno), conjuntivite alérgica perene, ceratoconjuntivite atópica (com a sua variação, blefaroceratoconjuntivite atópica), ceratoconjuntivite primaveril, conjuntivite papilar gigante e dermatite de contato.

Existem poucos dados epidemiológicos disponíveis no Brasil sobre alergia ocular.

Dermatite atópica (DA, frequentemente chamada eczema) é uma doença inflamatória crônica da pele com patogênese complexa que envolve susceptibilidade genética, fatores ambientais e disfunção imunológica e da barreira epidérmica. As lesões da pele vão desde o leve eritema até a grave liquenificação. O diagnóstico é por histórico e exame. O tratamento é realizado com hidratantes, supressão dos possíveis fatores irritantes desencadeantes e, comumente, corticoides tópicos ou moduladores imunitários. A DA infantil atópica frequentemente desaparece ou diminui significativamente na idade adulta

IV - COMENTÁRIOS:

Existem no SUS medicações disponibilizadas que se aplicam ao tratamento de dermatite atópica e conjuntivite alérgica. Os medicamentos solicitados estão descritos

1) **Patanol S Colírio**®– (Olopatadina): Indicação prevista em bula: solução oftálmica estéril é um medicamento indicado para o tratamento dos sinais e sintomas da conjuntivite alérgica. A olopatadina é um anti-histamínico não sedativo. No SUS não está disponível Olopatadina colírio . No mercado existe a



medicação genérica.

2) **Tracolumus colírio 0,03%** - Tacrolimus é uma lactona macrolídea isolada de culturas da bactéria *Streptomyces tsukubaensis*. Tacrolimus pertence a um grupo de fármacos chamados lactonas macrolídeas ou inibidores da calcineurina. Possui atividade imunossupressora semelhante à da Ciclosporina, sendo também utilizado para prevenir a rejeição de transplantes de órgãos. No SUS não está disponível a tracolumus colírio, somente comprimidos. No mercado está disponível medicação genérica.

3) **Ecofilm®** Lubrificante Ocular APRESENTAÇÃO Solução Oftálmica Estéril Frasco plástico conta-gotas contendo 5 mL ou 15 mL de solução oftálmica estéril de carmelose sódica (5 mg/mL). ECOFILM® é indicado no tratamento para melhora da irritação, ardor e secura dos olhos, que podem ser causadas pela exposição ao vento, sol, calor, ar seco, e para melhorar o desconforto que pode estar associado com a utilização de lentes de contato .. No SUS não está disponível Ecofilm. No mercado está disponível medicação genérica.

4) **NASONEX®** é indicado para o tratamento dos sintomas de rinite alérgica sazonal e perene, como congestão nasal, coriza, coceira e espirros, em pacientes adultos e pediátricos (a partir de 2 anos de idade). Também é indicado para a profilaxia dos sintomas nasais de rinite alérgica sazonal em pacientes adultos e adolescentes com 12 anos ou mais. Cada aplicação do spray nasal aquoso libera aproximadamente 50 mcg de furoato de mometasona. No SUS está disponível budesonida 32 e 64 mcg suspensão para inalação nasal ;.brometo de ipratrópio ; dipropionato de beclometasona 50 mcg/dose que apresentam a mesma finalidade. Medicação com mecanismo de ação semelhante que pode ser substituído sem prejuízo para o paciente.

5) **Mometasona pomada** :Este medicamento é indicado para o alívio da inflamação e do prurido (coceira) nas doenças de pele que respondem ao



tratamento com corticoides tópicos, como: psoríase (doenças com espessamento e descamação da pele), dermatite atópica e/ou dermatite alérgica de contato. **No SUS estão disponíveis** dexametasona e hidrocortisona creme que tem a mesma finalidade e mecanismo de ação.

Não foi apresentado nenhum elemento técnico objetivo de convicção indicativo de falha terapêutica após tentativa de abordagem com o uso dos medicamentos disponibilizados na rede pública em associação às medidas complementares (controle ambiental, higiene nasal, entre outras), para o tratamento das morbidades citadas.

V - CONCLUSÃO:

Não foi identificado em literatura técnico científica, embasamento para a indicação do uso específico das marcas das medicações solicitadas em caráter de urgência, em detrimento ao uso de medicações genéricas e/ou medicamentos disponíveis no Sistema Público de Saúde.

VI - REFERÊNCIA:

- 1) RENAME 2018
- 2) Aspectos clínicos e epidemiológicos da conjuntivite alérgica em serviço de referência, Arquivo Brasileiro Oftalmologia 2007;70(2):312-6.
- 3) Ceratoconjuntivite alérgica e ceratocone, Revista brasileira alergologia e imunopatologia 2007; 30(2):67-69.

DATA: 09/09/2019