



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

NATJUS/CGJ - Rua Goiás, 253, 8º andar, sala 801 - Belo Horizonte -MG
CEP 30190-030 – Telefone: (31) 3237-6282

RESPOSTA TÉCNICA 2017.000879

IDENTIFICAÇÃO DA REQUISIÇÃO

SOLICITANTE: MMA. Juíza de Direito Dra. Danielle Nunes Pozzer

PROCESSO Nº.: 0035180137024

CÂMARA/VARA: 1a Vara Criminal e da Infância e da Juventude de
Araguari

COMARCA: Araguari

I – DADOS COMPLEMENTARES À REQUISIÇÃO:

REQUERENTE: GST

IDADE: não informada

PEDIDO DA AÇÃO: OLANZAPINA, CLORIDRATO DE TRAZODONA,
BACLOFEM, DOMPERIDONA, MUVILAX, BUSCOPAN

DOENÇA(S) INFORMADA(S): (CID10) F73.1

FINALIDADE / INDICAÇÃO: Retardo mental profundo

REGISTRO NO CONSELHO PROFISSIONAL: CRMMG 21.621.

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 2017.000879

II – PERGUNTAS DO JUÍZO:

1 - Os medicamentos prescritos contribuem para a melhora do quadro de saúde do menor? Estes medicamentos podem ser substituídos por similares disponíveis na rede pública de saúde?

R.: Relatório médico anexado à solicitação de nota técnica indicou que a medicação prescrita tem a função de evitar crises neuropsíquicas, contribuindo para o bem estar do requerente.

- A **olanzapina** é integrante do componente especializado da RENAME, sendo liberada mediante solicitação fundamentada para o tratamento da esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo e transtorno bipolar, não tendo aprovação em bula para tratamento do retardo mental profundo. O SUS disponibiliza, em seu componente básico, alternativas à olanzapina para tratamento dos transtornos de humor, que incluem carbonato de lítio,



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

NATJUS/CGJ - Rua Goiás, 253, 8º andar, sala 801 - Belo Horizonte -MG
CEP 30190-030 – Telefone: (31) 3237-6282

carbamazepina, haloperidol e clorpromazina. Ademais, oferece, em seu componente especializado, mediante requerimento fundamentado: Risperidona, comprimidos de 1mg, 2mg e 3 mg; Quetiapina, comprimidos de 25mg, 100mg, 200mg e 300 mg; Ziprasidona cápsulas de 40mg e 80 mg e Clozapina, comprimidos de 25mg e 100 mg. O relatório do médico assistente não indicou ausência de resposta, histórico de efeitos colaterais ou contra-indicações aos medicamentos citados acima.

Na documentação anexada à solicitação de nota técnica também não foram indicadas justificativas para não utilização ou histórico de ausência de resposta ou às seguintes alternativas disponíveis no SUS e integrantes do componente básico da RENAME 2020:

- A **Trazodona** é indicada no tratamento da depressão com ou sem episódios de ansiedade, da dor associada à neuropatia diabética e de outros tipos de dores crônicas e no tratamento da depressão maior. Como alternativas à **trazodona**, medicamento do grupo dos antidepressivos: fluoxetina, nortriptilina, clomipramina ou amitriptilina.

- O **Muvinalax**, indicado para o tratamento da constipação intestinal, tratamento da impactação fecal (fezes endurecidas e “paradas” no intestino) e preparo intestinal antes de cirurgias e exames endoscópicos ou radiológicos. Como alternativas ao **Muvinalax**, são integrantes do componente básico da RENAME: óleo mineral, sulfato de magnésio em pó para solução oral, cáscara sagrada e lactulose– 667mg/ml.

- O **baclofeno** tem indicação de bula para reduzir e aliviar a rigidez excessiva e/ou espasmos nos músculos que podem ocorrer em várias condições tais como a esclerose múltipla, doenças ou lesões na medula óssea, e certas doenças cerebrais. Como alternativa ao **baclofeno**, **tem ação relaxante muscular os seguintes integrantes da RENAME 2020:** diazepam e clonazepam.

- A **domperidona** tem indicação em bula para Síndromes dispépticas



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

NATJUS/CGJ - Rua Goiás, 253, 8º andar, sala 801 - Belo Horizonte -MG
CEP 30190-030 – Telefone: (31) 3237-6282

frequentemente associadas a um retardo de esvaziamento gástrico, refluxo gastroesofágico e esofagite; sensação de empachamento epigástrico, saciedade precoce, distensão abdominal, dor abdominal alta; eructação, flatulência; náuseas e vômitos; azia, queimação epigástrica com ou sem regurgitação de conteúdo gástrico; náuseas e vômitos de origem funcional, orgânica, infecciosa ou alimentar ou induzidas por radioterapia ou tratamento medicamentoso (anti-inflamatórios, antineoplásicos). Uma indicação específica são as náuseas e vômitos induzidos pelos agonistas dopaminérgicos usados no tratamento da Doença de Parkinson como a L-dopa e bromocriptina. Como alternativa à **domperidona, no tratamento do refluxo gastroesofágico**: cloridrato de metoclopramida, o omeprazol, o cloridrato de ranitidina e o hidróxido de alumínio.

O **Buscopam** tem indicação em bula para tratamento dos sintomas de cólicas gastrintestinais (estômago e intestinos), cólicas e movimentos involuntários anormais das vias biliares e cólicas dos órgãos sexuais e urinários. Embora o SUS não disponibilize a medicação antiespasmódica **butilbrometo de escopolamina (Buscopan)**, a melhora do trânsito intestinal pode contribuir para melhora de cólicas intestinais decorrentes de constipação intestinal crônica e tornar desnecessário o uso do Buscopan (escopolamina). Relatório emitido pelo médico assistente não indicou a motivação específica para a prescrição do butilbrometo de escopolamina (Buscopan).

III – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

1. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) 2016 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder. Section 3. Pharmacological Treatments. Sidney H. Kennedy, MD, corresponding author¹, et al.
2. Organização Mundial de Saúde: “Classificação dos Transtornos Mentais e de Comportamento da CID 10”. Ed. Artes Médicas, Porto Alegre, RS.
3. Renam, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, 2020.
4. www.anvisa.gov.br. Bulário eletrônico. Portal ANVISA.



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

NATJUS/CGJ - Rua Goiás, 253, 8º andar, sala 801 - Belo Horizonte -MG
CEP 30190-030 – Telefone: (31) 3237-6282

-
5. Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review and network meta-analysis. Andrea Cipriani et al. The Lancet. Vol. 391; April 7, 2018.
 6. Conitec – consulta a fichas técnicas de medicamentos http://conitec.gov.br/images/FichasTecnicas/Venlafaxina_Depressao_29setj2016.pdf e http://conitec.gov.br/images/FichasTecnicas/trazodona_depressao_21dez2015.pdf
 7. Cascaes LHFS, Oliveira JC. Evidências sobre relaxantes musculares de uso ambulatorial: Uma revisão da literatura. Rev Bras Med Fam Comunidade. 2017;12(39):1-14. [http://dx.doi.org/10.5712/rbmfc12\(39\)1500](http://dx.doi.org/10.5712/rbmfc12(39)1500)
 8. Doença do Refluxo gastroesofágico. Sociedade Brasileira de Motilidade Digestiva e Neurogastroenterologia. <http://www.sbmdn.org.br/doenca-do-refluxo-gastroesofagico-drge/>
 9. Lesch–Nyhan syndrome and its variants: examining the behavioral and neurocognitive phenotype. James C. Harris. Curr Opin Psychiatry 2017, 30:000–000. DOI:10.1097/YCO.0000000000000388
 10. Chronic constipation. A review of literature. Forootan et al. Medicine (2018) 97:20. <http://dx.doi.org/10.1097/MD.00000000000010631>

V – DATA: 27/02/2020. NATJUS - TJMG