Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Rua Goiás, nº 253, 8º andar, sala 801, Centro
Belo Horizonte – MG CEP 30190-030

NOTA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DA REQUISIÇÃO

SOLICITANTE: MM. Juíza de Direito Dra Maria Beatriz de Aquino Gariglio

PROCESSO Nº.: 50006199420208130456

SECRETARIA: 2ª Vara Cível, Criminal e Infância e Juventude

COMARCA: Oliveira

I – DADOS COMPLEMENTARES À REQUISIÇÃO:

REQUERENTE: S. A. M.

IDADE: 61 anos

PEDIDO DA AÇÃO: Medicamentos Temozolomida

DOENÇA(S) INFORMADA(S): CID 10 C 71

FINALIDADE / INDICAÇÃO: Prestação Jurisdicional

REGISTRO NO CONSELHO PROFISSIONAL: CRMMG 54.616

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 2020.0001808

II – PERGUNTAS DO JUÍZO:

Solicito que informe a este Juízo se há ou não evidências científicas de que o medicamento pleiteado é o único indicado para o tratamento com sucesso de enfermidade do autor, bem como prestar informar prestações prévias técnicas a cerca do medicamento solicitado

III - CONSIDERAÇÕES SOBRE O CASO

Conforme relatório médico sem data, trata-se de SAM, **61 anos** apresentando **astrocitoma, submetido a ressecção subtotal da lesão,.** **Tem previsão de radioterapia.** Necessita de **Temozolomida**, a cada 4 semanas, por **1 ano para ganho de sobrevida global e tempo livre de progressão da doença, pois tem doença não é passível de cura.**

Os tumores cerebrais podem ser benigno ou maligno, primários (derivar do próprio tecido cerebral) ou secundário (metástase). **Os tumores**

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Rua Goiás, nº 253, 8º andar, sala 801, Centro
Belo Horizonte – MG CEP 30190-030

cerebrais primários são neoplasias malignas originárias de células de sustentação do tecido nervoso. São raros e correspondem a 2% de todos os cânceres. Sua letalidade, depende do grau de agressividade, e da localização e quanto mais agressivo maior é a mortalidade. Entre os tipos existentes, **o glioma originário das células da glia, astrócitos e oligodendrócitos é o mais comum.** São classificados de acordo com a World Health Organization (WHO), segundo a sua similaridade histopatológica com as células do SNC, que tem importante diferença na agressividade do tumor. São classificados como de grau I (não infiltrativo, de baixo potencial de proliferação e crescimento lento) a grau IV (infiltrativas, crescimento mais rápido). **Os gliomas de grau III e IV são chamados de alto-grau.**

Quadro 1 – Classificação da OMS)de gliomas astrocíticos

Classificação do Tumor	Grau do Tumor	Definição* ou aspectos característicos genéticos moleculares
Astrocitoma difuso, IDH-mutados II	II	Astrocitoma difuso, IDH-mutados II
Astrocitoma difuso, IDH tipo selvagem	II	Sem mutação IDH1/2
Astrocitoma anaplásico, IDH-mutados	III	Mutação IDH1/2 *, mutação TP53, mutação ATRX
Astrocitoma anaplásico, IDH tipo selvagem	III	Sem mutação IDH1/2
Glioblastoma, IDH-mutados	IV	Mutação IDH1/2 *, mutação TP53, mutação ATRX
Glioblastoma, IDH tipo selvagem	IV	Sem mutação IDH1/2, mutação promotora TERT
Glioblastoma, NA	IV	Teste genético não realizado ou não conclusivo

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Rua Goiás, nº 253, 8º andar, sala 801, Centro
Belo Horizonte – MG CEP 30190-030

Glioma difuso da linha mediana, H3 K27M mutado	IV	Mutação H3 K27M *
---	----	-------------------

* Alterações que definem a entidade de classificação da OMS são marcadas por um asterisco; IDH: fosfato-desidrogenase; ATRX: síndrome alfa talassemia / retardo mental ligada ao X; NAE: não anteriormente especificados;

A avaliação inicial compreende minuciosa história clínica, exame clínico neurológico detalhado e exames de neuroimagem, já que, em geral, suas queixas são inespecíficas de aumento da pressão hipertensão intracraniana. A extensão, localização, do tumor, relação com efeito de massa ou de edema cerebral são determinados por tomografia computadorizada contrastada, complementada por ressonância nuclear magnética e espectroscopia/perfusão, quando disponíveis. O diagnóstico definitivo é firmado pelo estudo histopatológico obtido de peças de biópsias estereotáxica ou a céu aberto e de cirúrgicas.

O curso da doença, prognóstico e o seu tratamento depende da localização, tamanho do tumor e condições clínicas do paciente, entretanto independente. Na abordagem terapêutica os pacientes devem ser avaliados e o plano de tratamento determinado por uma equipe multidisciplinar especializada, incluindo neurocirurgiões, oncologistas, radioterapeuta, patologista e neuroradiologista.

No Sistema Único de Saúde (SUS), as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas (DDT) para o tratamento do Tumor Cerebral preconiza cirurgia, radioterapia e quimioterapia de acordo com o caso. O uso de drogas como corticóides, antiepilépticos e anticoagulantes é indicado, respectivamente na presença de edema cerebral, convulsões e suspeita de tromboembolismo. A cirurgia é o tratamento de escolha. A cirurgia objetiva remover amplamente a neoplasia com a máxima

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Rua Goiás, nº 253, 8º andar, sala 801, Centro
Belo Horizonte – MG CEP 30190-030

preservação do tecido normal adjacente e das funções neurológicas. Assim deve ser máxima, desde que a função neurológica não seja comprometida pela extensão da ressecção, já que confere valor prognóstico. Eventualmente, a localização do tumor em áreas cerebrais nobres permite apenas a citorredução ou biópsia da lesão. Os fatores relacionados ao paciente, ao tumor e ao tipo de ressecção realizada, interferem no prognóstico e na terapia adjuvante. A sobrevivência mediana para pacientes com astrocitoma, descrita nos EUA em 2011 é de 5,2,. Os pacientes selecionados para terapia pós-operatória imediata devem receber radiação e quimioterapia sequencial. A radioterapia é utilizada como tratamento adjuvante à cirurgia, para tratar doença residual em pacientes com astrocitomas difusos. Dentre as principais condutas adjuvantes à cirurgia em pacientes portadores de gliomas de alto grau, a radioterapia é comprovadamente a mais eficaz e desempenha papel central no tratamento paliativo do tumor e na doença inicialmente inoperável ou recorrente. Pode também ser utilizada nas lesões irressecáveis, como resgate quando comprovada evolução da doença radiológica, piora neurológica ou mesmo na documentação de transformação maligna. A quimioterapia com procarbazina, lomustina e vincristina (PCV) em combinação com radioterapia tem sido usada. Nos tumores de baixo grau ainda não está claro o papel da temozolomida (TMZ) e não existem estudos comparando diretamente a TMZ versus o regime de PCV. Nos últimos anos, a TMZ tem sido preferida pela facilidade de seu uso e melhor tolerância pelos pacientes. Dessa forma, sugere-se o uso de TMZ quando o perfil de segurança e dificuldades de acesso ao regime PVC não permitirem a sua administração. No glioma de alto grau recorrente o uso de nitrosureia (carmustina ou TMZ), inclusive re-exposição a TMZ em dose

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Rua Goiás, nº 253, 8º andar, sala 801, Centro
Belo Horizonte – MG CEP 30190-030

protraída ou mesmo combinações de bevacizumabe, com quimioterapia (lomustina e irinotecano) está indicado.

A TMZ, é uma droga antineoplásica oral, relacionado a um antineoplásico clássico, a dacarbazina da qual se diferencia que por ser convertida ao antineoplásico clinicamente ativo (monometil-triazenoimidazol carboxamida, MTIC) no plasma sem necessidade de metabolização hepática como a dacarbazina. Segundo a ANVISA possui indicação para o tratamento de pacientes com: glioblastoma multiforme (GMF) recém-diagnosticado, em tratamento associado à radioterapia, e posteriormente seguido de tratamento de monoterapia com TMZ isoladamente, para tumores cerebrais como glioma maligno, GMF ou astrocitoma anaplásico, recidivados ou com progressão após tratamento padrão e no melanoma maligno metastático. A evidência atualmente disponível sobre eficácia e segurança da TMZ para tratamento principalmente de gliomas de alto Grau (estádios III e IV) com poucas evidências do seu uso nos de baixo grau. Em ECR sobre TMZ em associação à radioterapia para gliomas de alto grau, este tratamento mostraram ser ativo quando comparado com placebo; eficácia comparável da TMZ e do esquema PCV para doentes com gliomas de alto grau ou com astrocitoma anaplásico. Assim os resultados mostraram que a TMZ não aumenta a sobrevida geral de modo significativo se comparada a quimioterapia padrão. Seus resultados são mais expressivos se usada nas duas fases concomitante e adjuvante à radioterapia, nesta situação é melhor que a radioterapia isolada e provoca melhoria na sobrevida geral e no tempo de vida livre de tumor, prolongando a sobrevida, retardando a progressão sem afetar a qualidade de vida e com eventos adversos. Entretanto, inexistem evidências de que TMZ seja mais segura ou eficaz que outra

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Rua Goiás, nº 253, 8º andar, sala 801, Centro
Belo Horizonte – MG CEP 30190-030

terapia antineoplásica associada à radioterapia nos gliomas malignos.

Vale ressaltar que as DDT para o tratamento do Tumor Cerebral orientam que doentes adultos com diagnóstico de neoplasia maligna cerebral devem ser preferencialmente atendidos em hospitais habilitados em oncologia com serviço de radioterapia e minimamente naqueles com porte tecnológico suficiente para diagnosticar, tratar e realizar o monitoramento clínico necessário. A associação de cirurgia, quimioterapia padrão e radioterapia são o tratamento padrão que podem variar de acordo com cada caso. A opção pelo tratamento mais adequado deve ser uma decisão compartilhada entre o médico, o paciente e os familiares para uma decisão quanto ao mesmo. Os procedimentos radioterápicos (Grupo 03, Subgrupo 01) e cirúrgicos (Grupo 04, Subgrupo 03) da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS podem ser acessados, por código do procedimento ou nome do procedimento e por código da CID – Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – para a respectiva neoplasia maligna, no SIGTAP-Sistema de Gerenciamento dessa Tabela. De modo geral o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde não padronizam e nem fornecem medicamentos antineoplásicos diretamente aos hospitais/usuários do SUS. Os procedimentos quimioterápicos da tabela do SUS não fazem referência a qualquer medicamento e são aplicáveis às situações clínicas específicas para as quais terapias antineoplásicas medicamentosas são indicadas. Ou seja, os hospitais credenciados no SUS e habilitados em Oncologia são os responsáveis pelo fornecimento de drogas oncológicas que eles, livremente, padronizam, adquirem e fornecem, cabendo-lhes codificar e registrar conforme o procedimento respectivo do SUS. Assim, a partir do momento em que um hospital é habilitado para prestar assistência

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Rua Goiás, nº 253, 8º andar, sala 801, Centro
Belo Horizonte – MG CEP 30190-030

oncológica pelo SUS, a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento antineoplásico é desse hospital, seja ele público ou privado, com ou sem fins lucrativos. DDT dos tumores cerebrais, sugere que nos últimos anos, a TMZ tem sido preferida pela facilidade de seu uso e melhor tolerância pelos pacientes. Dessa forma, sugere-se o uso de TMZ quando o perfil de segurança e dificuldades de acesso ao regime PVC não permitirem a sua administração. No glioma de alto grau recorrente o uso de nitrosureia (carmustina ou TMZ), inclusive re-exposição a TMZ em dose protraída ou mesmo combinações de bevacizumabe, com quimioterapia (lomustina e irinotecano) está indicado.

Conclusões: trata-se de paciente de **61 anos** com **astrocitoma, já operado com resseção subtotal. Previsão de radioterapia.** Necessita do **TMZ** a cada 4 semanas, **por 1 ano para ganho de sobrevida global e tempo livre de progressão da doença, pois apresenta doença não passível de cura. Sem outras informações, incluindo o grau do tumor oque dificulta estabelecer a necessidade desta indicação.**

Os tumores cerebrais primários são um conjunto de neoplasias malignas originárias de células de sustentação do tecido nervoso. Sua letalidade depende da localização e do grau de agressividade e os originários das células da glia, astrócitos e oligodendrócitos são os mais comum. Eles são classificados de acordo com WHO, segundo a sua similaridade histopatológica, que associa-se a sua agressividade em 4 graus. Os gliomas de grau III e IV são chamados de gliomas de alto-grau. O tratamento envolve cirurgia, radioterapia e quimioterapia que podem prolongar a sobrevida. O tratamento não é isento de efeitos adversos e cabe ao médico, paciente e familiares a decisão se o aumento de sobrevida com prejuízo da qualidade de vida é desejável.

A TMZ, é uma droga antineoplásica oral, relacionado a

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Rua Goiás, nº 253, 8º andar, sala 801, Centro
Belo Horizonte – MG CEP 30190-030

dacarbazina. **Conforme as DDT, inexistente demonstração de que a TMZ seja mais segura ou eficaz que outra terapia antineoplásica associada à radioterapia para gliomas malignos. Os estudos disponíveis, a despeito de suas limitações, revelaram haver equivalência terapêutica da TMZ versus quimioterapia padrão, da qual o paciente ainda não fez uso. DDT refere que nos últimos anos, a TMZ tem sido preferida pela facilidade de seu uso e melhor tolerância pelos pacientes. Sugere-se o seu uso quando o perfil de segurança e dificuldades de acesso ao regime PVC não permitirem a sua administração. Em situações específicas do glioma de alto grau recorrente a nitrosureia (carmustina ou TMZ) associada a outras drogas pode ser usado.**

Vale ressaltar que esta indicação não tem possibilidade de cura e as DDT norteiam as melhores condutas na área da Oncologia, não restringindo às tecnologias incorporadas no SUS. Elas orientam o que pode ser oferecido ao paciente, considerando o financiamento repassado aos centros de atenção e a autonomia destes na escolha da melhor opção para cada situação clínica, podendo o hospital utilizar a TMZ no roll de suas drogas, e disponibilizá-la dentro da APAC.

IV – REFERÊNCIAS:

1. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Relatório de recomendação. Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas (DDT) do Tumor Cerebral no Adulto. Brasília, 2019. 305p. Disponível em: http://conitec.gov.br/images/Consultas/2019/Relatorio_DDT_TumorCerebral_Adulto_CP77_2019.pdf.
2. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde e Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos. Comissão Nacional de Incorporação de tecnologias no SUS – CONITEC. Relatório de

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Rua Goiás, nº 253, 8º andar, sala 801, Centro
Belo Horizonte – MG CEP 30190-030

recomendação nº 104. Temozolomida para o tratamento adjuvante de pacientes portadores de Gliomas de Alto Grau. Brasília, Setembro/2014. 34p. Disponível em: http://conitec.gov.br/images/Artigos_Publicacoes/Temozolomida_FINAL.pdf.

3. Faculdade de Farmácia UFMG. Departamento de Farmácia Social. Centro de Colaborador do SUS Avaliação de Tecnologias e Excelência em Saúde. Parecer técnico-científico PTC 05/2012. Eficácia e segurança de temozolamida no tratamento de astrocitoma de baixo grau Belo Horizonte, 2012 39p. Disponível em: <http://www.ccates.org.br/eficacia-e-seguranca-de-temozolomida-no-tratamento-de-astrocitoma-de-baixo-grau/>

4. Parasramka S, Talari G, Rosenfeld M, Guo J, Villano JL. Procarbazine, lomustine and vincristine for recurrent high-grade glioma. **Cochrane Database of Systematic Reviews**. 2017, Issue 7. Art No: CD011773. Disponível em: <https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD011773.pub2/pdf/full>.

5. Hart MG, Garside R, Rogers G, Stein K, Grant R. Temozolomide for high grade glioma. **Cochrane Database of Systematic Reviews**. 2013, Issue 4. Art No: CD007415. Disponível em: <https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD007415.pub2/epd/full>.

V – DATA:

17/04/2020

NATJUS - TJMG