



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Rua Goiás, nº 253, 8º andar, sala 801, Centro
Belo Horizonte – MG CEP 30190-030

RESPOSTA TÉCNICA 1573

IDENTIFICAÇÃO DA REQUISIÇÃO

SOLICITANTE: MM. Juiz de Direito Dr.Espagner Wallysen Vaz Leite

PROCESSO Nº.: 50033667720198130512

CÂMARA/VARA: Juizado Especial da Fazenda Pública

COMARCA: Pirapora

I – DADOS COMPLEMENTARES À REQUISIÇÃO:

REQUERENTE: MAP

IDADE: 48 anos

PEDIDO DA AÇÃO: Triancil 20mg

DOENÇA(S) INFORMADA(S): C159

FINALIDADE / INDICAÇÃO: dilatação esofágica

REGISTRO NO CONSELHO PROFISSIONAL: CRMMG -49782

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 2019.0001573

II – PERGUNTAS DO JUÍZO:

1) O(s) medicamento(s) solicitado(s) (TRIANCIL 20mg/ml) é (são) aprovado(s) para Anvisa? 2) O(s) medicamento(s) solicitado(s) está(ão) incluído(s) na lista do RENAME dentre os componentes básicos da assistência farmacêutica? 3) Em caso negativo, há protocolo para inclusão na lista de medicamentos de alto custo para o tratamento do quadro da solicitante? 4) O(s) medicamento(s) é (são) produzido(s)-fornecido(s) por empresa sediada no País ou depende(m) de importação? 5) Qual o prazo necessário para o seu fornecimento? 6) Qual o custo médio do(s) medicamento(s) solicitado(s)? 7) Existem medicamentos similares fornecidos pela rede pública? 8) Existe alguma outra observação a ser feita?

III – CONSIDERAÇÕES/RESPOSTAS:

As estenoses esofágicas resultam de lesão da parede do órgão com



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Rua Goiás, nº 253, 8º andar, sala 801, Centro
Belo Horizonte – MG CEP 30190-030

conseqüente espessamento de suas camadas e evolução até fibrose, podendo ser de etiologia congênita ou adquirida. Esses pacientes apresentam grande morbidade com conseqüências sérias, como perda de peso, desnutrição, impactação alimentar e aspiração pulmonar.

Os objetivos do tratamento das estenoses de esôfago são o alívio da disfagia e a prevenção da recorrência do estreitamento. Os métodos terapêuticos atuais consistem de intervenção cirúrgica, dilatações endoscópicas e uso de próteses endoluminais auto-expansíveis e removíveis, sendo que estes dois últimos constituem o tratamento conservador das estenoses e têm diminuído em muito as indicações para a abordagem cirúrgica. A esofagectomia com reconstrução do trânsito através de interposição gástrica ou intestinal apresenta elevada morbidade e resultados incertos a longo prazo, sendo reservada aos casos refratários à terapêutica endoscópica.

O tratamento conservador através de dilatações orientadas por **fio-guia é de escolha nas estenoses esofágicas e proporciona taxas elevadas de alívio da disfagia com baixo índice de complicações e facilidade técnica**. Os dilatadores de uso mais freqüente são os guiados por fio metálico (Savary-Gilliard, Eder-Puestow, Celestin, Plummer-Jackson), os de borracha (Tucker) e os balões hidrostáticos ou pneumáticos de poliuretano. As estenoses de esôfago são dilatadas por sondas, ogivas ou balões pneumáticos. Embora a dilatação por balão seja efetiva e exerça uma força radial e uniforme no local da estenose, **ela não se mostra o método de escolha no tratamento das estenoses em nosso meio. A dilatação esofágica por balão é de custo elevado, o acessório é preconizado para uso em apenas uma sessão de dilatação e, na literatura, observa-se que não há diferença significativa entre os dilatadores guiados por fio-guia e os balões de poliuretano quanto à eficácia e taxa de complicações.**



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Rua Goiás, nº 253, 8º andar, sala 801, Centro
Belo Horizonte – MG CEP 30190-030

O uso intralesional de corticosteróides (acetato de triancinolona) nas estenoses esofágicas mais complexas tem merecido destaque na literatura, e o seu emprego é justificado com base na diminuição da resposta inflamatória, da fibrose e da formação de re-estenoses após as dilatações, observada através da melhora da sintomatologia, da manutenção do diâmetro esofágico durante a dilatação e do aumento do intervalo entre as sessões endoscópicas.

O procedimento consta na tabela SIGTAB SUS 04.07.01.002-5 – DILATAÇÃO ESOFÁGICA / PILÓRICA

O medicamento Triancil®, cujo princípio ativo é a triancinolona hexacetona, é um medicamento corticoide com ação anti-inflamatória. Apresenta registro na ANVISA; e o preço médio consultado de 70,00 a 100,00 reais frasco 5ml/20 mg.

IV – CONCLUSÕES

- ✓ O uso de triancinolona está bem indicado juntamente com dilatação para estenose de esôfago
- ✓ Não existem evidências suficientes para afirmar que a dilatação com balão apresenta melhores resultados que as orientadas por fio guia
- ✓ O procedimento está disponível no SUS

V – REFERÊNCIAS:

- ✓ Tratamento das estenoses esofágicas por dilatação endoscópica em crianças e adolescentes
- ✓ Portal Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva
- ✓ Guidelines on the use of oesophageal dilatation in clinical practice. Gut. 2004;53(Suppl 1):i1-6. 6. Riley SA, Attwood SEA.

V – DATA: 27/05/2020

NATJUS - TJMG