

Data: 18/06/2013

NTRR 100/2013^a

Solicitante:

Juiza de Direito Dra. Herilene de Oliveira Andrade

Número do processo: 335.13.1151-3

Réu: Município de Itapecerica

TEMA: Foraseg® na DPOC

Medicamento	x
Material	
Procedimento	
Cobertura	

Sumário

1. Resumo executivo	2
1.1 Recomendação.....	2
2. Análise da solicitação	3
2.1 Pergunta clínica estruturada.....	3
2.2 Contexto ¹	3
2.3 Descrição da tecnologia a ser avaliada	3
3. Resultados ¹	4
4. Conclusão.....	4
5. Referências.....	5


^a LE

1. RESUMO EXECUTIVO

Solicitação

“Conforme peças em anexo, solicitamos a Vossa Senhoria oferecer parecer acerca dos medicamentos em uso pela parte autora, quanto ao seu fornecimento substitutibilidade dentro prazo de 48(quarenta e oito) horas, a partir do recebimento deste.”

Relatório médico:



1.1 RECOMENDAÇÃO

A composição do Foraseg® é formoterol + budesonida.

Não há indicação clínica de usar **Foreseq®** em detrimento de formoterol e budesonida oferecidos pelo SUS.

2. ANÁLISE DA SOLICITAÇÃO

2.1 PERGUNTA CLÍNICA ESTRUTURADA.

População: Paciente portador de DPOC

Intervenção: Foraseg®

Comparação: medicamentos fornecidos pelo SUS

Desfecho: melhora dos sintomas

2.2 CONTEXTO¹

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) se caracteriza por sinais e sintomas respiratórios associados a obstrução crônica das vias aéreas inferiores, geralmente em decorrência de exposição inalatória prolongada a material particulado ou gases irritantes. O tabagismo é a principal causa. O substrato fisiopatológico da DPOC envolve a bronquite crônica e o enfisema pulmonar, os quais geralmente ocorrem de forma simultânea, com variáveis graus de comprometimento relativo num mesmo indivíduo. Os principais sinais e sintomas são tosse, falta de ar, chiado no peito e expectoração crônicos. A DPOC está associada um quadro inflamatório sistêmico, com manifestações como perda de peso e redução da massa muscular nas fases mais avançadas. Entre 5% e 10% da população adulta nos países industrializados sofre de DPOC.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a DPOC é a quarta principal causa de morte, depois do infarto do miocárdio, câncer e doença cerebrovascular. Entre as principais causas de morte, é a única que está aumentando, prevendo-se que se torne a terceira em 2020, devido ao aumento do tabagismo nos países em desenvolvimento, juntamente ao envelhecimento da população. Nos últimos dez anos, a DPOC foi a quinta maior causa de internação no Sistema Único de Saúde (SUS) em maiores de 40 anos, com cerca de 200.000 hospitalizações e gasto anual aproximado de 72 milhões de reais.

2.3 DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA A SER AVALIADA

Foraseq®

Fabricante: Novartis

fumarato de formoteroldi-hidratado + budesonida

Indicações de Bula:

Fumarato de formoteroldiidratado (tratamento 1): é indicado para profilaxia e tratamento de broncoconstrição em pacientes com asma como terapia adicional aos glicocorticóides inalatórios incluindo bronquite crônica e enfisema. O formoterol mostrou aumentar a qualidade de vida nos pacientes com DPOC. budesonida (tratamento 2): é indicado para asma brônquica. Quando inalada, a budesonida tem uma ação antiinflamatória local nos pulmões, com um efeito corticóide sistêmico mínimo.

3. RESULTADOS¹

Para nortear uma assistência médica e farmacêutica efetiva e de qualidade quanto ao tratamento da doença, o Ministério da Saúde elaborou um protocolo clínico para a DPOC, com o objetivo de estabelecer critérios de diagnóstico de doenças, de análises de tratamentos com os medicamentos e doses adequadas, criar mecanismos para o monitoramento clínico quanto à efetividade do tratamento e supervisão de possíveis efeitos adversos e para a garantia da prescrição segura e eficaz.

Segundo o PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS– DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA do Ministério da Saúde (2012):

Formoterol + budesonida: O Formoterol é disponibilizado pelo SUS através da Secretaria de Saúde de Minas Gerais para pacientes com DPOC, dentro do programa de medicamentos de alto custo, assim como a budesonida.

4. CONCLUSÃO

Não há indicação clínica de usar **Foreseq®** em detrimento de formoterol e budesonida oferecidos pelo SUS.

5. REFERÊNCIAS

1. Protocolo Clínico Para tratamento de DPOC. Acesso em: 21/06/2013.

Disponível em:

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/cp_04_dpoc_2012.pdf