

RESPOSTA RÁPIDA 103/2014

Informações sobre Aciclovir

SOLICITANTE	Dr ^a Renata Perdigão Juiza de Campo Belo
NÚMERO DO PROCESSO	Autos nº. 112.14.000761-1
DATA	10/03/2014
SOLICITAÇÃO	LIMINAR Nº 27 Autos nº. 112.14.000761-1 Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de Tutela Antecipada ajuizada por J.S. assistida pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em face do MUNICÍPIO DE CRISTAIS. Alegou o (a) requerente que é portadora de Uveíte herpética hipertensiva. A requerente necessita do medicamento Aciclovir 400mg de 12/12 hrs, podendo a dose variar de acordo com a evolução clínica. Pelo risco de danos visuais é muito importante o uso correto da medicação. Alegou por fim, que não possui condições de arcar com essa despesa, por se tratar de pessoa pobre.

CONSIDERAÇÕES

INICIAIS

A infecção por *Herpes simplex* vírus (HSV) é causa frequente de inflamação intra-ocular ou uveíte anterior. A hipertensão ocular é característica comumente observada nas ceratouveítes herpéticas.

Acredita-se que o HSV tipo 1 seja responsável pelo aparecimento do quadro de iridociclite, enquanto o HSV tipo 2 é observado nos casos de necrose aguda de retina (ARN).

A uveíte herpética se caracteriza pela recorrência, tendo sido este fato postulado como característica patognomônica da doença. Acredita-se que fatores desencadeadores das recorrências estejam associados a estados imunológicos do portador.

O aumento da pressão intra-ocular é outro ponto importante e comumente observado nas ceratouveítes herpéticas, sendo estas então, a causa mais comum de glaucoma secundário a uveítes.

Os vírus mais comuns causadores de uveíte são citomegalovírus (CMV) , herpes zoster e Herpes simplex . Estas infecções devem ser tratadas imediatamente com antivirais adequados. Na infecção herpética da retina, a destruição da retina (necrose aguda de retina) ,pode progredir rapidamente. Embora os pacientes imunodeprimidos tenham maior risco de necrose aguda de retina, também pode ocorrer em pacientes com um sistema imunológico intacto.

Além de tratar a infecção de base, os pacientes com uveíte anterior, são muitas vezes tratados com glucocorticóides tópicos após o início da medicação antiviral.

Aciclovir

Indicações de Aciclovir

Tratamento de infecções pelo herpes simplex na pele e mucosas, inclusive herpes genital inicial e recorrente. Na prevenção e supressão de recidivas de infecções recorrentes por herpes simplex em pacientes imunocompetentes. Profilaxia de infecções pelo herpes zoster.

	Conclusão Aciclovir 200mg - esta listado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) – Componente Básico da Assistência Farmacêutica, portanto, devendo ser disponibilizado pela secretaria municipal de saúde.
--	--