

## RESPOSTA RÁPIDA 232 /2014

### Hidrotórax fetal

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>SOLICITANTE</b>        | Juiz João Adilson Nunes Oliveira<br>Comarca de Montes Claros   |
| <b>NÚMERO DO PROCESSO</b> | 043314018906-2   |
| <b>DATA</b>               | 06/05/2014   |
| <b>SOLICITAÇÃO</b>        | <p>De ordem do MM. Juiz de Direito em substituição eventual na 2ª Vara Empresarial e de Fazenda Pública da Comarca de Montes Claros-MG, notifico V.Sa. para que dê cumprimento à decisão que deferiu a liminar nos autos do processo nº, conforme cópias anexas, com a urgência que o caso requer. Informo que nesta data, já foi expedido mandado para intimação do representante legal do Estado de Minas Gerais, nesta cidade, bem como, expedida carta precatória para citação e intimação do Estado de Minas Gerais nessa capital.</p> <p>Paciente com gravidez de 32-33 semanas, sendo identificado ao US hidrotórax fetal ilateral, necessitando de tratamento urgente.</p> |
| <b>RESPOSTA</b>           | <p>O hidrotórax congênito é doença rara e potencialmente grave, colocando em risco a viabilidade fetal e do recém-nascido.</p> <p>O diagnóstico dessa patologia é realizado através de ultrassonografia, sendo a idade média gestacional de diagnóstico as 27,3 semanas. O diagnóstico diferencial deve ser feito com hérnia diafragmática, malformação adenomatosa cística pulmonar e sequestro pulmonar.</p>   |

Todos os casos de hidrotórax fetal devem ser acompanhados em centros terciários, com uma equipe multidisciplinar que contenha obstetras, geneticistas, neonatologistas e cirurgiões pediátricos.

A intenção da terapêutica pré natal é evitar a compressão do tórax, causando hipoplasia pulmonar e hidropsia fetal.

Nos casos em que o derrame permaneça estável e não curse com sinais de descompensação, o recomendado é realizar ultrassonografias seriadas a cada 2 a 3 semanas. Já nos casos, em que o hidrotórax é volumoso ou já curse com hidropsia fetal, a terapêutica antenatal, melhora o prognóstico destes fetos.

Uma metanálise, mostrou que a taxa de mortalidade nos casos em que não se realiza terapêutica fetal ocorre em 50% dos casos, 42% nos casos em que foi realizada a toracocentese e 22% nos casos em que foi feita a derivação pleuroamniótica.

**A drenagem cirúrgica do hidrotórax fetal é realizado intra-útero pela equipe de Medicina Fetal do Hospital das Clínicas de Belo Horizonte.**

Devido à idade fetal, a paciente deverá ser encaminhada ao Serviço de Medicina Fetal do Hospital das Clínicas de Belo Horizonte **em caráter de urgência** para avaliar a viabilidade de realizar o procedimento.

.