

RESPOSTA RÁPIDA 266/2014

SOLICITANTE	Maria Augusta Balbinot Juíza de Direito Comarca de São João Del Rei – MG
NÚMERO DO PROCESSO	0625.14.004724-6
DATA	21/05/2014
SOLICITAÇÃO	<p>N.T.L. ingressou com ação em desfavor do Município de São João del-Rei e do Estado de Minas Gerais pleiteando o fornecimento do medicamento Xarelto 15 mg.</p> <p>Alega ser portador de trombose de veia porta e mesentérica e necessitar do medicamento para seu tratamento, uma vez que o mesmo é imprescindível para reduzir a pressão na veia porta e prevenir as hemorragias das veias varicosas do esôfago e assim conseguir manter o controle da patologia em questão.</p> <p>Do relatório médico que instruiu a inicial, consta:</p> <p>"À Secretaria de Saúde do Estado de MG. Ref. N.T.L.. O paciente supracitado, 31a, solt, apresenta trombose venosa de v. porta-mesentérica, (... palavra inelegível ...), em uso prolongado (pelo menos 6 meses) do anticoagulante oral Xarelto. Solicito avaliação de fornecimento do medicamento por 6 meses. Dr. Marcos de Bastos - Hematologista - CRM 13225" (Formulário do próprio médico, datado de 13/03/2014)</p>

	<p>No receituário médico está prescrito: Xarelto 15 mg, 180 cp. Tomar 1 cp/dia por 180 dias.</p> <p>Solicito sua análise e informações técnicas no prazo de 48 horas sobre a adequação dos fármacos solicitados, prazo para utilização e demais observações que Vossas Senhorias entenderem relevantes.</p> <p>DADOS DO PROCESSO</p> <p>AUTOS 0625.14.004724-6 (numeração única 0047246-35.2014.8.13.0625)</p> <p>N.T.L. X MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DEL-REI e ESTADO DE MINAS GERAIS</p>
<p>RESPOSTAS</p>	<p>O Xarelto® é produzido pelo Laboratório Farmacêutico Bayer Pharma. Trata-se de um anticoagulante de uso oral, a rivaroxabana, que atua como inibidor de uma das proteínas envolvidas na coagulação sanguínea, denominada Fator Xa (fator dez ativado).</p> <p>Como anticoagulante foi testado nas seguintes situações clínicas:</p> <ul style="list-style-type: none">- prevenção da trombose associada a alguns procedimentos cirúrgicos ortopédicos;- no tratamento e na prevenção da trombose venosa profunda de qualquer etiologia.- na prevenção da embolia cerebral que pode ocorrer em associação com a fibrilação atrial (FA) e causar isquemia cerebral. <p>Não está disponível no SUS e não consta da RENAME.</p> <p>A warfarina (Marevan®) é um anticoagulante de uso oral, disponível no SUS, que atua sobre outra proteína da cascata coagulante, o fator II ou protrombina. A dose da Warfarina deve ser controlada através da realização frequente de exame de sangue, para dosar o RNI.</p> <p>O uso da rivaroxabana não exige este tipo de controle.</p> <p>A warfarina substitui a rivaroxabana. É o anticoagulante de referência e a primeira opção na maioria das situações clínicas em que há indicação de anticoagulação.</p>

Os sangramentos são o efeito colateral mais temido destes medicamentos. O warfarin tem um antídoto que pode ser usado nos casos de hemorragia provocada pelo mesmo. A **rivaroxabana não tem antídotos.**

A warfarina substitui a rivaroxabana. Constitui o anticoagulante de referência e a primeira opção na maioria das situações clínicas em que há indicação de anticoagulação.

Portanto, a rivaroxabana pode ser substituída pela Warfarina (disponível no SUS), sem prejuízo para o paciente.

Observação: Há um agravante no uso dos novos anticoagulantes como rivaroxabana (Xarelto®) e outros.

A warfarina **exige** a realização periódica de exame (dosagem de RNI) que monitora a intensidade do efeito anticoagulante do medicamento, porque o nível de coagulação está sujeito a uma série de condições pessoais, clínicas e alimentares. O RNI mede a atividade de protrombina.

O fabricante da rivaroxabana afirma que este medicamento não necessita de ajustes de doses.

A possibilidade de usar um anticoagulante oral que não exija este controle é visto como uma vantagem. Mas, apesar de não necessitar da realização de exames de monitoramento de dose, a rivaroxabana (Xarelto®) expõe os usuários a risco de complicação hemorrágica pelo menos igual ao que acontece com o uso da warfarina. Sem controle de qualquer natureza, estes pacientes ficam mais expostos ao atraso no diagnóstico destas complicações hemorrágicas.