

RR 381/2013 CONDROFLEX®

SOLICITANTE	Juíza de Direito da Comarca de Itapecerica Herilene de Oliveira Andrade
NÚMERO DO PROCESSO	Autos nº 0335.13.2271-8
DATA	26-11-13
SOLICITAÇÃO	<p>Conforme peças constantes do anexo, solicitamos de Vossa Senhoria parecer acerca dos medicamentos em uso pelo(a) autor(a) quanto ao fornecimento e substitutibilidade, no prazo de quarenta e oito horas do recebimento deste. Atenciosamente,</p> <p>Herilene de Oliveira Andrade Juíza de Direito da Comarca de Itapecerica</p> <div style="text-align: center;"> <p>Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itapecerica-MG AMBULATÓRIO MÉDICO</p>  <p>PAC. FORTABONA DE ARTROSE, NECESSITA TBMAR CONDOFLEX SACHÊ 1 AO DIA.</p> <p>21.11.13</p>   </div> <p style="text-align: right;">Declaração</p> <p>Declaro para os devidos fins que o medicamento prescrito a Srª. [Redacted] Condroflex Sachê não consta na lista de medicamentos básicos nem faz parte do elenco de medicamentos de alto custo.</p> <p>É o que me cumpre a declarar.</p> <p>Itapecerica, 22 de Novembro de 2013.</p> <p style="text-align: center;">  Farmácia Municipal. </p>

<p>RESPOSTA</p>	<p>A osteoartrose ou osteoartrite é uma doença de evolução lenta caracterizada por dor, edema, deformidade e limitação do movimento das articulações acometidas. Leva a um declínio na qualidade de vida das pessoas acometidas. Em 2001, foi responsável por mais de 16 mil anos de vida perdidos, ajustados por incapacidade (disability-adjusted life years, DALYs), em todo o mundo.</p> <p>O tratamento da osteoartrite têm como objetivo o controle da dor e do edema, a diminuição da incapacidade, a melhora na qualidade de vida e a educação do paciente sobre o problema. É realizado por meio de medicamentos e também de medidas não farmacológicas, como fisioterapia e exercícios aeróbicos.</p> <p>Quanto aos medicamentos, até o presente momento, não há uma medicação específica que possa prevenir a progressão da osteoartrite.</p> <p>Os medicamentos têm o papel de aliviar a dor e a inflamação. A medicação de primeira escolha é o paracetamol, que pode melhorar a dor e apresenta menos efeitos adversos que os anti-inflamatórios. Quando não há melhora com esse, pode-se, então, prescrever um anti-inflamatório. Entretanto, os seus efeitos colaterais sobre o aparelho gastrointestinal (gastrite, úlcera, sangramento) limitam o seu uso. Deve ser usado por menor tempo possível e evitados nos pacientes com úlcera gástrica prévia, com idade maior que 65 anos, que fumam e ingerem bebidas alcoólicas, que estão em uso concomitante de glicocorticoides ou anticoagulantes e que apresentem infecção no estômago pela bactéria H.pylori.</p> <p>A medicação Condroflex® é composta de Sulfato de glicosamina 1,5 g e Sulfato sódico de condroitina 1,2 g. A sua indicação de bula é artrose primária e secundária, osteocondrose, espondilose, condromalacia de rótula e periartrite escápulo-humeral.</p> <p>O uso da glucosamina e da condroitina no tratamento da osteoartrite é controverso e o resultado dos estudos randomizados controlados é diverso. A evidência advinda dos estudos de mais alta qualidade têm mostrado pouca ou nenhuma evidência de benefício clínico significativo. Os trabalhos que sugerem benefícios dessas medicações mostram várias falhas metodológicas.</p>
<p>CONCLUSÃO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Não há recomendação. O tratamento da osteoartrite com a medicação Condroflex® é controverso. Restam dúvidas na literatura médica se essa medicação é realmente eficaz. ✓ No SUS (Postos de Saúde) há medicamentos que são recomendados para o tratamento da osteoartrite. É o caso do paracetamol e do anti-inflamatório ibuprofeno.

Kenneth C Kalunian .Pharmacologic therapy of osteoarthritis. Disponível em www.uptodate.com.

Literature review current through: May 2013. | This topic last updated Out 6, 201