

**RESPOSTA RÁPIDA 347/2013**

**Nutrienteral 1,5 kcal**

<b>SOLICITANTE</b>	LÚCIA HELENA FERREIRA ESCRIVÃ JUDICIAL
<b>NÚMERO DO PROCESSO</b>	0471.13.017402-5
<b>DATA</b>	29/10/2013
<b>SOLICITAÇÃO</b>	CUMPRINDO DETERMINAÇÃO DA 2ª JD DA UNIDADE JURISDICIONAL DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE PARÁ DE MINAS-MG, SOLICITO A VOSSA SENHORIA QUE FORNEÇA PARECER EM 48(QUARENTA E OITO) HORAS, ACERCA DO MEDICAMENTO EM USO PELA AUTORA NO PROCESSO Nº 0471.13.017402-5, SENDO ESTES RESOLOR-2MG;BENESTARE E MOVIDIL E ESPECIALMENTE QUANTO AO FORNECIMENTO E SUBSTITUTIBILIDADE DESTES.
<b>RESPOSTAS</b>	<p><b>Esclarecimentos:</b></p> <p>RESOLOR- 2MG;BENESTARE E MOVIDIL são medicamentos indicados para constipação intestinal.</p> <p>No contexto da constipação crônica, medidas não-medicamentosas constituem a primeira escolha para manejo inicial, com ênfase em abordagem dietética e de hábitos de vida. Dependendo do mecanismo gerador do problema, outras abordagens não-medicamentosas são propostas. Quando não há resposta aos tratamentos não medicamentosos, são propostos os laxantes.</p> <p>O <b>Resolor®</b> é indicado para o tratamento sintomático da obstipação crônica em mulheres nas quais os laxantes deixaram de produzir o alívio adequado. Não está liberado para uso em homens. Os poucos estudos realizados com este novo medicamento o</p>

compararam a nenhum tratamento em mulheres com constipação crônica e mostraram que o seu uso teve melhor resultado que tratamento nenhum ( placebo).

Porém, ele não foi comparado a medicamentos já existentes para constipação.

Um medicamento do mesmo grupo farmacológico foi comparado a laxantes tradicionais e mostrou pior resultado. Portanto, o ganho real com o uso do Resolor não é ainda conhecido.

**BENESTARE®** (policarbofila cálcica) pode ser usado quando se deseja a regularização do hábito intestinal, com o aumento do teor de água das fezes: na obstipação intestinal crônica, funcional ou associada à diverticulose. Na síndrome do intestino irritável, quer nos períodos de constipação quer nos episódios diarreicos. Na obstipação secundária a alterações na dieta, mudança de hábitos ou períodos variáveis de restrição ao leito, por enfermidade clínica ou cirúrgica. Nas doenças perianais onde o amolecimento e um maior teor de água nas fezes sejam desejáveis, como nas fissuras e abscessos anais e nas hemorroidas. No tratamento sintomático das diarreias agudas e crônicas.

Em avaliação de 68 pacientes com constipação crônica em estudo aberto, aleatório e cruzado com histórico de constipação crônica, com o objetivo de comparação da eficácia do Psyllium com a policarbofila (dose máxima de 4 g),

Bass et al. (1988) observaram que ambos os fármacos apresentaram a mesma eficácia no controle da constipação crônica.

Portanto, o Benestare não demonstrou resultados melhores que Psyllium,

**Movidil ®** é uma fibra alimentar solúvel e sem sabor à base de polidextrose, um polissacarídeo diferenciado e amplamente utilizado como fibra substituta ao açúcar e à gordura, auxiliando o trânsito intestinal, na redução e no controle dos níveis glicêmicos e lipídicos e na redução da ingestão de calorias e açúcares.

Movidil é um polímero de glicose altamente ramificado com uma disposição única de ligações glicosídicas, que o torna resistente à hidrólise pelas enzimas digestivas humanas. Após a ingestão de Movidil, a polidextrose é parcialmente fermentada no intestino grosso pela microflora colônica, mas não é digerida nem absorvida no intestino delgado, sendo a sua maior parte excretada nas fezes. Dessa forma, Movidil é uma fibra de valor calórico reduzido (1

	<p>kcal/grama).</p> <p>Não é fornecido pelo SUS. Alternativamente, o SUS oferece <b>lactulose</b>, que também é um polímero da glicose com a mesma finalidade.</p> <p><b>CONCLUSÃO:</b></p> <p>Medidas não-medicamentosas constituem a primeira escolha para tratamento da constipação intestinal, com ênfase em abordagem dietética e de hábitos de vida.</p> <p>Os laxativos estão indicados quando as primeiras alternativas falham, não demonstrando diferença significativa de eficácia entre eles, sobretudo por longo prazo. Quando usados em esquemas recomendados, sua segurança se equivale.</p>
--	--