

18/05/2016

**RT 11/2016**

**TEMA: DERMOLIPECTOMIA E CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE  
DIASTASE DE RETOS ABDOMINAIS E RECONSTRUÇÃO DA PAREDE  
ABDOMINAL APÓS CIRURGIA DE OBESIDADE MÓRBIDA**

**SOLICITANTE: Desembargador Marco Aurélio Ferenzini**

**NÚMERO DO PROCESSO: 10313.14.029224-1/001**

**Autor: B.F.F.**

**RÉU: USISAUDE - fornecido pela Fundação São Francisco Xavier**

**CONTEXTO**

**Relatório médico**

HOSPITAL MÁRCIO CUNHA

CENTRO DE ODONTOLOGIA INTEGRADA

AMBULATÓRIO SÃO FRANCISCO XAVIER

Relatório Médico

o Sr.

[Redacted Box]

1º) cirurgia plástica redução estômago e  
apresenta volumoso hernia suprapúbica  
e Abdomen em Acento. Já possui  
hernia el. recidiva. Sem melhor  
prognóstico acento da cirurgia  
plástica corretiva. (dermolipectomia  
Abdominal nos estôma)

Dr. Ricardo Zandim  
CRM 9195  
CONTROLE 1879988

16-09-13



Classificação da informação: Confidencial  
Grupo de acesso: Médico e paciente

### **SOBRE O PROCEDIMENTO DERMOLIPECTOMIA**

A dermolipectomia é a ressecção do excesso de pele do corpo. Não é um procedimento isento de risco, sendo relatados no pós-operatório: hemorragia, linforrêia, infecção, necrose da pele, acidentes tromboembólicos, deiscência e

atraso na cicatrização da ferida operatória. Em até 24% dos casos pode ser necessária uma nova cirurgia para corrigir “defeitos” da cirurgia anterior.<sup>1,2</sup>

Segundo resolução normativa da ANS , número 338 de 02/01/2014<sup>a</sup>, os planos de saúde tem obrigação de oferecer a dermolipectomia para os seus clientes em caso de: *“Cobertura obrigatória em casos de pacientes que apresentem abdome em avental decorrente de grande perda ponderal (em consequência de tratamento clínico para obesidade mórbida ou após cirurgia de redução de estômago), e apresentem uma ou mais das seguintes complicações: candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odor fétido, hérnias, etc.”*


A dermolipectomia é considerada um procedimento estritamente estético e não tem cobertura nos sistemas de saúde públicos como os da Inglaterra, Austrália e Canadá.

## **SOBRE A CORREÇÃO CIRÚRGICA DA DIASTASE DOS RETOS ABDOMINAIS**

A diastase dos retos abdominais é um termo anatômico que descreve a separação dos músculos retos por uma distância anormal. A obesidade é um fator de risco para esse problema. A primeira linha de tratamento para essa condição deve ser conservadora, com perda de peso e exercícios de fortalecimento para os músculos abdominais. Para os pacientes nos quais o tratamento conservador não surtiu efeito, a cirurgia de abdominoplastia com a plicatura do reto, com ou sem colocação de tela, pode ser realizada. Esse procedimento, nessa situação, é considerado eletivo e cosmético. A recorrência da diastase dos retos, após a cirurgia, tem sido descrita em até 40% dos casos.<sup>3</sup>

---

<sup>a</sup>[http://www.ans.gov.br/images/stories/Anexos\\_I\\_e\\_II\\_da\\_RN\\_349.pdf](http://www.ans.gov.br/images/stories/Anexos_I_e_II_da_RN_349.pdf)



(<http://www.urban-rehab.org/rectus-diastris-physiotherapy.html>)

### **AVALIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO/CONCLUSÃO**

Tendo como base o relatório médico de 2013, o paciente teria indicação de ser submetido à dermolipectomia e correção cirúrgica de diastase de retos abdominais. Entretanto, não temos informação do peso atual do paciente. Caso tenha ocorrido ganho ponderal não teria indicação para nenhuma das duas cirurgias.

## REFERÊNCIAS

1- Chaouat M, Levan P, Lalanne B, Buisson T, Nicolau P, Mimoun M. Abdominal dermolipectomies: early postoperative complications and long-term unfavorable results. *Plast Reconstr Surg*. 2000 Dec;106(7):1614-8

2- Stewart KJ, Stewart DA, Coghlan B, Harrison DH, Jones BM, Waterhouse N. Complications of 278 consecutive abdominoplasties. *J Plast Reconstr Aesthet Surg*. 2006;59(11):1152-5.

3- Nahabedian M, Brooks DC. Rectus abdominis diastasis. Disponível em [www.uptodate.com](http://www.uptodate.com). Literature review current through: Oct 2015. | This topic last updated: May 20, 2015.