

**NOME DO MAGISTRADO:** MARIA FERNANDA MANFRINATO BRAGA

**Nº DE MATRÍCULA TJMG:** 00083196

**E-MAIL:** gab.exm1secretaria@tjmg.jus.br

**COMARCA:** Extrema

**CÂMARA/VARA :** VARA ÚNICA

**PROCESSO Nº:** 0251170016298

**PERGUNTA(S) DO JUÍZO:**

Necessito de Nota Técnica que informe sobre a eficácia do medicamento ELTROBOMPAG (REVOLADE) 25MG

- uso contínuo (03 comprimidos, uma vez ao dia), para tratamento de paciente com Leucemia Linfocítica Crônica (CID C911), o qual APÓS QUIMIOTERAPIA, mantém plaquetopenia grave persistente, tendo sido prescrito o uso URGENTE do referido medicamento.

**ESTADO DE EMISSÃO**

**DO CRM: SP**

**NÚMERO DO CRM:** 122585

**Nº DE CPF OU CDI DO**

**REQUERENTE:** 07869177849

**IDADE:** 78

**PEDIDO DA AÇÃO:** MEDICAMENTO

**MEDICAMENTO:** ELTROBOMPAG (REVOLADE) 25MG

**DOENÇA (CID):** C911

**FINALIDADE/INDICAÇÃO:**

Para tratamento de paciente com Leucemia Linfocítica Crônica (CID C911), o qual APÓS QUIMIOTERAPIA, mantém plaquetopenia grave persistente, tendo sido prescrito o uso URGENTE do referido medicamento.

**Comentários.** O medicamento Revolade® é liberado pela Anvisa para utilização no tratamento de púrpura trombocitopênica idiopática (PTI);o Revolade® é um agonista do receptor de trombopoetina utilizado para o tratamento de plaquetopenia em pacientes (PTI) de origem imune, os quais tiveram resposta insuficiente a corticosteroides ou esplenectomia (retirada do baço). Revolade® está indicado apenas para pacientes com púrpura trombocitopênica idiopática que apresentam risco aumentado de sangramento e hemorragia. Revolade® não deve ser usado simplesmente para aumentar a contagem de plaquetas.

Nas advertências do próprio fabricante consta: ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES A eficácia e a segurança de Revolade® para uso em outras condições trombocitopênicas, que incluem **trombocitopenia induzida por quimioterapia**, síndromes mielodisplásicas (SMD) e pacientes portadores de Hepatite C, não foram estabelecidas.

**No caso em tela:**

- A etiologia da plaquetopenia apresentada pelo paciente não está de acordo com as indicações previstas
- A plaquetopenia da paciente esta relacionada a manifestações sistêmicas da leucemia linfocítica crônica pós quimioterapia
- A medicação Revolade® só tem indicação de bula no Brasil para tratamento de púrpura trombocitopênica crônica idiopática (PTI).
- Mesmo para tratamento de PTI, a medicação Revolade® melhorou a plaquetopenia, de mediana

de 30.000/mm<sup>3</sup> para 50.000mm<sup>3</sup>, o que foi insuficiente para modificar o risco de sangramento.

- O medicamento não está na RENAME

-Não foram estabelecidas por estudos a eficácia deste medicamento no tratamento de plaquetopenia induzida por quimioterapia

**Conclusão:** Não encontramos embasamento para a indicação desse medicamento para tratamento de plaquetopenia após quimioterapia.

NATS- JUS  
CEMED