



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 200, 4º andar, sala 410, Edifício Libertas - Belo Horizonte - MG
CEP 30170-000-Telefone (31) 3248-4230 – email: cemed.natjus@tjmg.jus.br

RESPOSTA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DA REQUISIÇÃO

SOLICITANTE: MM. Juíz de Direito Dr Gustavo Vargas de Mendonça

PROCESSO Nº.0384170050007

SECRETARIA: Juizado Especial da Fazenda Pública

COMARCA: Leopoldina

I – DADOS COMPLEMENTARES À REQUISIÇÃO:

REQUERENTE: FCMB

IDADE: 40

PEDIDO DA AÇÃO: fornecimento de enoxaparina 80 mg e 40 mg

DOENÇA(S) INFORMADA(S):D68

FINALIDADE / INDICAÇÃO: trombofilia na gravidez

REGISTRO DO PROFISSIONAL PRESCRITOR: CRMMG nº 41393

II – PERGUNTAS DO JUÍZO:

Existe outro medicamento mais barato que pode ser substituído?

R: Não

Há previsão de fornecimento pelo SUS de similar ou genérico?

R: Não

Qual o prazo do tratamento?

R: Durante toda gestação; mais um mês após o término da gestação.

Há risco de aborto caso não seja fornecida a medicação?

R: Sim.

Comentários:

Paciente com abortamento de repetição e diagnóstico de trombofilia. As trombofilias são doenças que causam aumento da coagulação sanguínea, com conseqüente aumento do risco de obstrução dos vasos sanguíneos. Esta obstrução é denominada trombose .A trombose venosa profunda e a embolia pulmonar (doença tromboembólica) na gestação são raras e, em poucos



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 200, 4º andar, sala 410, Edifício Libertas - Belo Horizonte - MG
CEP 30170-000-Telefone (31) 3248-4230 – email: cemed.natjus@tjmg.jus.br

casos, fatais. De acordo com alguns estudos, sua incidência na gravidez varia de 0,055 a 0,13%. Entretanto, consiste na principal causa de mortalidade materna em países desenvolvidos. A maioria dos casos de óbitos é devido à embolia pulmonar. O uso de anticoagulantes é recomendado no tratamento da doença tromboembólica. Na gravidez são usadas as heparinas porque não cruzam a placenta. Há dois tipos de heparina: a heparina não fracionada (obtida do intestino do porco) e a heparina de baixo peso molecular (obtida pela despolimerização da heparina não fracionada, tendo um peso molecular específico). uso de anticoagulantes é recomendado no tratamento da doença tromboembólica. Os anticoagulantes incluem heparinas não-fracionadas que podem ser usadas em mini doses, heparinas de baixo peso molecular, como a enoxaparina por exemplo e anticoagulantes orais. Heparinas são usadas para o tratamento da trombose venosa profunda durante a gravidez porque não cruzam a placenta. Os objetivos para o tratamento da gestante com trombofilia são melhorar os desfechos materno-fetais, minimizando os riscos de complicações, inclusive trombose materna, perdas fetais, pré-eclampsia, insuficiência placentária e crescimento uterino retardado. A heparina é a droga anticoagulante de escolha durante a gestação. A heparina não atravessa a placenta e é considerada segura para o feto. A heparina de baixo peso molecular (por exemplo, o Clexane®) parece ser mais recomendada durante a gestação, associada ao uso de baixa dose de aspirina. As heparinas de baixo peso molecular têm sido associadas a um menor índice de sangramentos volumosos, a um menor risco de trombocitopenia (um grave complicador do tratamento, com índice de mortalidade de até 20%) e a frequência menor de fraturas osteoporóticas.

Conclusão:

A paciente necessita de uso domiciliar de heparina de baixo peso molecular, conforme prescrição médica – Clexane® ou outra enoxaparina disponível no mercado, 40 mg ao dia até um mês após o final da gestação. A continuidade



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 200, 4º andar, sala 410, Edifício Libertas - Belo Horizonte - MG
CEP 30170-000-Telefone (31) 3248-4230 – email: cemed.natjus@tjmg.jus.br

após a gestação será avaliada pelo médico assistente.

O Manual Técnico sobre Gestaç o de Alto Risco do Minist rio da Sa de traz recomendaç es que devem ser adotadas na Trombose Venosa Profunda, incluindo o emprego das HBPM na gravidez, ouso indicado   das HBPM enoxaparina ou deltaparina.

III – REFER NCIAS:

- 1) CONITEC SUS <http://conitec.gov.br/>.
- 2).Portal CNJ

IV – DATA:

11/10 /2017

CEMED – NAT JUS