



## Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 200, 4º andar, sala 410, Edifício Libertas - Belo Horizonte - MG  
CEP 30170-000-Telefone (31) 3248-4230 – email: cemed.natjus@tjmg.jus.br

### RESPOSTA TÉCNICA

#### IDENTIFICAÇÃO DA REQUISIÇÃO

**SOLICITANTE:** MM. Juiz de Direito Dra. Patrícia Biterncourt Moreira

**PROCESSO Nº.** 00440563920188130394

**SECRETARIA:** Juizado Especial

**COMARCA:** Manhuaçu

#### I – DADOS COMPLEMENTARES À REQUISIÇÃO:

**REQUERENTE:** A. H

**IDADE:**

**PEDIDO DA AÇÃO:** OZURDEX (07 mg)

**DOENÇA(S) INFORMADA(S):** H360

**FINALIDADE / INDICAÇÃO:** Retinopatia Diabética Proliferativa

**REGISTRO NO CONSELHO PROFISSIONAL:** CRMMG 67148

**NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:** 2018.000730

#### III – PERGUNTAS DO JUÍZO:

solicito informação acerca da evidência científica quanto ao uso do medicamento abaixo listado, para tratamento da doença que acomete a parte autora. ademais, solicito informação igualmente acerca da existência de outros medicamentos, padronizados pelo sus, para tratamento da mesma doença.

#### III – CONSIDERAÇÕES SOBRE MEDICAMENTO:

*OZURDEX® é indicado para uso oftálmico, através de injeções dentro dos olhos, em pacientes adultos*

- disfunção da visão devido a edema macular diabético (**EMD**) que são **pseudofáquicos**
- **Pacientes que têm uma resposta considerada insuficiente à terapêutica não corticosteroide**, nos quais esta terapêutica é inadequada



## Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 200, 4º andar, sala 410, Edifício Libertas - Belo Horizonte - MG  
CEP 30170-000-Telefone (31) 3248-4230 – email: cemed.natjus@tjmg.jus.br

- edema macular após Oclusão do Ramo da Veia Central da Retina (ORVCR) ou Oclusão da Veia Central da Retina (OVCR)
- inflamação do segmento posterior do olho apresentada como uveíte não infecciosa

OZURDEX® é um medicamento com efeitos anti-inflamatórios potentes, e que é usado principalmente em doenças inflamatórias, para ser injetado dentro do olho por médico especializado nessa técnica, e sua ação se inicia imediatamente após sua administração.

Este medicamento é contraindicado para pessoas com hipersensibilidade (alergia) à dexametasona ou qualquer dos componentes deste produto.

Este medicamento é contraindicado para pessoas com infecções ou suspeita de infecções oculares ou não redor dos olhos, incluindo as infecções por vírus que atingem a córnea e a conjuntiva, como herpes simples, vacínia, varicela (catapora), infecções por micobactérias e por fungos. Pacientes com glaucoma avançado; Pacientes afácicos com ruptura da cápsula posterior do cristalino; Pacientes com olhos com lente intraocular de câmara anterior (ACIOL), lente intraocular fixada na íris ou com fixação escleral e quando houver ruptura da cápsula posterior do cristalino.

**Pacientes com perda da visão muito acentuada – abaixo de 20/200** ( consegue ler à distância de 20 metros o que uma pessoa com acuidade visual total é capaz de ler à distância de 200 metros) já é pouco provável a reversão do quadro. No caso em tela esta descrito visão 20/400 isso significa que consegue ler à distância de 20 metros o que uma pessoa com acuidade visual total é capaz de ler à distância de 400 metros, portanto acuidade visual pior que o que seria o limite para utilização de antigênicos .

**V – DATA:** 21/08/2018

NATJUS - TJMG