



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 200, 4º andar, sala 410, Edifício Libertas, Centro
Belo Horizonte – MG CEP 30170-000

RESPOSTA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DA REQUISIÇÃO

SOLICITANTE: MM. Juiz de Direito Dr. Vinicius Gomes de Moraes

PROCESSO Nº.0145180066303

SECRETARIA: 1UJ 1DJ

COMARCA: Juiz de Fora

I – DADOS COMPLEMENTARES À REQUISIÇÃO:

REQUERENTE: AFC

IDADE: 48

PEDIDO DA AÇÃO: Medicamento micofenolato de mofetila

DOENÇA(S) INFORMADA(S): Síndrome de Sjögren

FINALIDADE / INDICAÇÃO: Como opção terapêutica substituta à opção terapêutica disponível na rede pública - SUS

REGISTRO NO CONSELHO PROFISSIONAL: CRMMG 55654

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: :2018000782

II – PERGUNTAS DO JUÍZO:

- 1) Existe alguma evidência científica de que o fármaco (Micofenolato Mofetila 500mg) solicitado apresente resultado superior aos fornecidos pelo SUS?
- 2) Sendo afirmativa a resposta acima o quadro apresentado pelo autor subsidia a indicação?
- 3) Agradecemos qualquer informação complementar a critério desse nobre órgão.

III – CONSIDERAÇÕES/RESPOSTAS:

A síndrome de Sjögren (SS) é uma doença crônica autoimune caracterizada por infiltração linfocítica das glândulas salivares e lacrimais, que leva à progressiva destruição dessas glândulas. Pode ocorrer como uma síndrome localizada, que causa primariamente secura de boca e olhos (síndrome seca), ou como uma doença sistêmica, afetando múltiplos órgãos. Pode ainda ocorrer



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 200, 4º andar, sala 410, Edifício Libertas, Centro
Belo Horizonte – MG CEP 30170-000

como um distúrbio primário ou secundário. No distúrbio primário, um paciente sem doença conhecida do tecido conjuntivo desenvolve os sintomas clássicos da síndrome seca

O tratamento recomendado para as vasculites, independentemente do órgão comprometido, é a imunossupressão com metilprednisolona em pulso de altas doses por três dias, associado a imunossupressores (azatioprina, micofenolato mofetil ou ciclofosfamida). A ciclofosfamida tem sido o imunossupressor mais frequentemente empregado. O tratamento da vasculite cutânea pode ser inicialmente com glicocorticoide oral (0,5-1 mg/kg/dia) ou pulsoterapia com metilprednisolona (a depender da gravidade do quadro) e imunossupressor. Casos refratários ao esquema inicial podem ser tratados com rituximabe.

O medicamento consta no RENAME 2017 e está disponível no SUS.

V – DATA: 17/09/2018

NATSJUS - TJMG