



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 200, 4º andar, sala 410, Edifício Libertas - Belo Horizonte - MG
CEP 30170-000-Telefone (31) 3248-4230 – email: cemed.natjus@tjmg.jus.br

RESPOSTA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DA REQUISIÇÃO

SOLICITANTE: MM. Juiz de Direito Dr. Francisco Lacerda Figueiredo

PROCESSO Nº.:0021823372018

SECRETARIA: Vara Única

COMARCA: São João da Ponte

I – DADOS COMPLEMENTARES À REQUISIÇÃO:

REQUERENTE: .JLPS

IDADE: 56

PEDIDO DA AÇÃO: Dastane

DOENÇA(S) INFORMADA(S): N40

FINALIDADE / INDICAÇÃO: Hiperplasia da próstata

REGISTRO NO CONSELHO PROFISSIONAL: CRMMG 64719

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:2018.000775

II – PERGUNTAS DO JUÍZO:

Utilização do medicamento Dastane no tratamento de hiperplasia da próstata.

III – CONSIDERAÇÕES/RESPOSTAS:

Hiperplasia prostática benigna (HPB) é o neoplasma benigno mais comum em homens, caracterizado por crescimento excessivo e proliferação do epitélio e do tecido fibromuscular da próstata, que exerce pressão sobre a uretra e obstrui o fluxo urinário. Infecção urinária de repetição, retenção urinária, hematúria e insuficiência renal são complicações que se seguem na história natural da doença. Os sintomas podem melhorar sem tratamento, mas o curso normal é uma lenta progressão.

Os principais fármacos disponíveis para tratar HPB são os bloqueadores alfa-adrenérgicos (ex.: terazosina, doxazosina, tansulosina, alfuzosina) e os



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 200, 4º andar, sala 410, Edifício Libertas - Belo Horizonte - MG
CEP 30170-000-Telefone (31) 3248-4230 – email: cemed.natjus@tjmg.jus.br

inibidores da enzima 5 alfa-redutase (ex.: finasterida, dutasterida).O medicamento A dutasterida como indicação de bula o tratamento e prevenção da progressão da Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) inibindo as duas isoformas da 5 alfa-redutase. Este fármacos reduzuz o volume prostático com consequente diminuição da obstrução mecânica da uretra. O efeito ocorre após cerca de seis meses de tratamento, contudo, a melhora dos sintomas, **quando observada**, requer tratamentos médios de três anos. **As melhores evidências atualmente disponíveis não demonstram vantagem clinicamente relevante da dutasterida em relação à finasterida. A finasterida está disponível no SUS.**

IV – REFERÊNCIAS:

Portal CNJ

Portal Anvisa

V – DATA: 11/10/2018

NATJUS - TJMG