



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Av. Augusto de Lima, 1549, 3º andar, sala P-358, Fórum Lafayette
Belo Horizonte – MG CEP 30190-002

RESPOSTA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DA REQUISIÇÃO

SOLICITANTE: MM. Juiz de Direito Dra. Fernanda Chaves Carreira Machado

PROCESSO Nº.: 0317180122259

VARA: Unidade Jurisdicional do Juizado Especial

COMARCA: Itabira

I – DADOS COMPLEMENTARES À REQUISIÇÃO:

REQUERENTE: ACF

IDADE: 50

PEDIDO DA AÇÃO: Medicamento

DOENÇA(S) INFORMADA(S): N067

FINALIDADE / INDICAÇÃO: Como opção terapêutica substituta à opção terapêutica disponível na rede pública - SUS

REGISTRO NO CONSELHO PROFISSIONAL: CRMMG 42025

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 2018. 867.

II – PERGUNTAS DO JUÍZO:

Há indicação de uso de micofenolato de mofetila para tratamento de glomerulonefrite crônica com proteinúria CID N06.7. Há medicamentos fornecidos pelo SUS, além de corticoides, que possam ser utilizados no tratamento da doença? Trata-se de prescrição off label?

III – CONSIDERAÇÕES/RESPOSTAS:

O Micofenolato de Mofetila é um agente imunossupressor. A indicação de uso descrita na bula é para profilaxia de rejeição aguda de órgãos (no transplante renal, cardíaco e hepático) e no tratamento da primeira rejeição ou rejeição refratária no transplante renal, devendo nestes casos ser usado em associação com a ciclosporina A e corticosteroides.

Apesar da ausência de indicação na bula; o uso do medicamento em pacientes com nefrite secundária ao LES (Lupus Eritematoso Sistêmico), tem sido considerado uma opção terapêutica alternativa segura



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Av. Augusto de Lima, 1549, 3º andar, sala P-358, Fórum Lafayette
Belo Horizonte – MG CEP 30190-002

e eficaz. Os estudos realizados e o Consenso da Sociedade Brasileira de Reumatologia para o diagnóstico, manejo e tratamento da nefrite lúpica, incluem o uso do Micofenolato de Mofetila entre as medicações convencionais.

Na literatura consultada não observamos indicação do medicamento para N06-7 (proteinúria isolada com lesão morfológica especificada). Caso esta proteinúria esteja associada a LES o medicamento solicitado tem indicação..

IV – REFERÊNCIAS:

- 1 – Consenso da Sociedade Brasileira de Reumatologia para o diagnóstico, manejo e tratamento da nefrite lúpica. Revista Brasileira de Reumatologia, 2015;55(1):1-21.
- 2 – Tratamento da Nefrite Lúpica, Ana Catarina Gomes Meireles, Mestrado Integrado em Medicina, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, março/2013.
- 3- Portal do CONITEC

V – DATA: 30/10/2018

NATJUS - TJMG