



## Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Av. Augusto de Lima, 1549, 3º andar, sala P-358, Fórum Lafayette  
Belo Horizonte – MG CEP 30190-002

### NOTA TÉCNICA

#### IDENTIFICAÇÃO DA REQUISIÇÃO

**SOLICITANTE:** MM. Juiz de Direito Dra. Maria Isabela Freire Cardoso

**PROCESSO Nº.:** 0433180215082

**SECRETARIA:** UJ - 2º JD

**COMARCA:** Montes Claros

#### **I – DADOS COMPLEMENTARES À REQUISIÇÃO:**

**REQUERENTE:** WOL

**IDADE:** 34 anos

**PEDIDO DA AÇÃO:** Medicamento MODAFILINA (STAVIGILE)

**DOENÇA(S) INFORMADA(S):** G474

**FINALIDADE / INDICAÇÃO:** Evitar sonolência diurna

**REGISTRO NO CONSELHO PROFISSIONAL:** CRM: 35880

**NOTA TÉCNICA:** 2019.000875

#### **II – PERGUNTAS DO JUÍZO**

Solicito informações acerca do medicamento pretendido, a patologia apresentada, bem como, sobre o tratamento prescrito e competência para a sua realização.

**III – CONSIDERAÇÕES/RESPOSTAS:** A narcolepsia é uma condição que causa sonolência excessiva durante o dia, com a presença de episódios de sono incontroláveis, frequentemente em horas inapropriadas, como, por exemplo, durante a alimentação, a conversação, etc. OS Efeitos da modafinila na sonolência da narcolepsia apresentam Nível de Recomendação A com grau de evidência I em dois estudos multicêntricos (US Modafinil in Narcolepsy Multicenter Study Group) com 550 pacientes com narcolepsia seguidos por nove semanas demonstraram que a modafinila nas doses de 200mg uma vez ao dia ou 400mg em duas tomadas promoveu uma melhora de 71% da sonolência diurna subjetiva medida pela Escala de Sonolência de Epworth (variação de 18 para 12 pontos) e



## **Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais**

Av. Augusto de Lima, 1549, 3º andar, sala P-358, Fórum Lafayette  
Belo Horizonte – MG CEP 30190-002

aumento as latências do Teste de Latências Múltiplas do Sono (TLMS) e do Teste de Manutenção da Vigília (TMV) em 40% e 54%, respectivamente<sup>29,30</sup>. Não foi observada redução significativa dos ataques de cataplexia<sup>29,30</sup>. Outros estudos randomizados com seguimento de até 40 semanas ou estudos abertos com seguimento de 136 semanas mostraram resultados positivos no controle da SE<sup>1,31-33</sup>. 2. Doses de modafinila para o tratamento da sonolência na narcolepsia . O início de tratamento deve ser com 100mg pela manhã, aumentando-se 50 a 100mg a cada cinco dias. A dose mais segura da modafinila é de 200mg pela manhã; após duas semanas, pode-se aumentar mais 200, 300 ou 400mg de manhã se houver sintomas de sonolência residual<sup>1,31-34</sup>. O regime de doses divididas em 200mg de manhã e 200mg à tarde é mais seguro, com menos efeitos colaterais e mais eficiente, impedindo reaparecimento da sonolência no final da tarde, quando comparado à dose única de 400mg pela manhã. A dose máxima segura de modafinila é de 600mg ao dia.

### **IV – CONCLUSÃO:**

**Stavigile® -modafinila é indicada como a primeira escolha para o tratamento da sonolência diurna**

### **V – REFERÊNCIAS:**

<http://www.hcnet.usp.br/ipq/revista/vol34/n3/133.html> (2) Disponível em:  
[http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/83aa480040290028a81ff8dc5a12ff52/L\\_ISTA+CONFORMIDADE\\_2013-06-28.pdf?MOD=AJPERES](http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/83aa480040290028a81ff8dc5a12ff52/L_ISTA+CONFORMIDADE_2013-06-28.pdf?MOD=AJPERES) (3)  
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbp/v32n3/16.pdf> (4) Disponível em:  
[http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MAIS\\_ALERTAS/DETALHE\\_ALERTA?itemid=3322199](http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MAIS_ALERTAS/DETALHE_ALERTA?itemid=3322199)

**VI – DATA:** 24/01/2019

NATJUS – TJMG